Exercice I. Soit $A(-2; 1)$ et $B(4; -2)$ deux points du plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On note (C) l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que : $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$ (Faire la figure sur une feuille séparée)

- 1°) Déterminer l'ensemble des points M de (C) .
- 2°) Déterminer une équation de la droite (AB) .
- 3°) Déterminer les points d'intersection I et J de (AB) avec (C) .
- 4°) Déterminer une équation de la tangente à (C) au point $K(2; -1)$.

Exercice II Soit ABC un triangle $AB = c$; $AC = b$ et $BC = a$.
Connaissant certaines indications sur le triangle, déterminer d'autres éléments du triangle

- a) $\hat{A} = \frac{P}{6}$; $\hat{B} = \frac{P}{6}$ et $a = 1$; calculer b .
- b) $\hat{A} = \frac{2P}{3}$; $b = 1$ et $c = 2$; calculer a .
- c) $\hat{A} = \frac{P}{3}$; $a = \sqrt{3}$ et $b = 1$; calculer l'aire du triangle.

Exercice III. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(-3; -1)$ et $B(5; 3)$.

Trouver l'ensemble E des points M de coordonnées $(x; y)$ tels que les vecteurs $2\vec{MA} + \vec{MB}$ et $\vec{MA} + 2\vec{MB}$ soient orthogonaux.

Exercice IV. Pour ceux qui travaillent en plus

Sur la figure ci-contre, les triangles ABC et CBD sont isocèles;

$BD = 1$; $BC = x$; $\angle ABC = \angle BCA = a$ et $\angle BAC = 5a$.

1. Donnez une valeur de a en radians.
2. Déterminez une mesure de chacun des angles BAD , ADB et ABD en fonction de a .
3. Calculez AB et AC en fonction de x .
4. En utilisant la règle des sinus, établir que $\frac{\sin(3a)}{x} = \sin a$ et que $\frac{\sin(3a)}{x-1} = \sin(2a)$
5. En utilisant $3a = 2a + a$, établir que $\sin(3a) = \sin(a) \times (4\cos^2 a - 1)$
6. En déduire que $x = 4\cos^2 a - 1$ et que $1 - x = \frac{4\cos^2 a - 1}{2\cos a}$
7. Démontrer que finalement $\cos \frac{P}{7}$ est solution de l'équation $8X^3 - 4X^2 - 4X + 1 = 0$

CORRECTION

Exercice I. Soit A(-2 ; 1) et B(4 ; -2) ; (C) $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$

1°) $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 25$

L'ensemble recherché est donc le cercle de centre $\Omega (-1 ; 3)$ et de rayon 5 cm.

2°) (AB) ; $\overrightarrow{AB} (6 ; -3)$; $\overrightarrow{AM} (x + 2 ; y - 1)$ d'où $x + 2y = 0$

3°) de (AB) on obtient $x = -2y$ soit $4y^2 + y^2 + 2(-2y)x - 6y - 15 = 0$
 $y^2 - 2y - 3 = 0$ donc I(-6 ; 3) et J(2 ; -1)

4°) $\overrightarrow{\Omega K} \cdot \overrightarrow{KM} = 0$ donc $3x - 4y - 10 = 0$

Exercice II

1. $\hat{A} = \frac{P}{6}$; $\hat{B} = \frac{P}{6}$ et $a = 1$; calculer b . le triangle est isocèle donc $b = 1$. (pas de calculs inutiles)

2. $\hat{A} = \frac{2P}{3}$; $b = 1$ et $c = 2$; calculer a .

$$a^2 = 1 + 4 - 2 \times 2 \times 1 \cos(2\pi/3) \text{ donc } a = \sqrt{7}$$

3. $\hat{A} = \frac{P}{3}$; $a = \sqrt{3}$ et $b = 1$; calculer l'aire du triangle.

$$\sin \hat{B} = (b \cdot \sin \hat{A}) / a = 1/2 \quad \text{d'où } \hat{B} = \frac{P}{6} \text{ et } \hat{C} = \frac{P}{2} \text{ donc l'aire} = ab/2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Exercice III. A(-3 ; -1) et B(5 ; 3).

$$(2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}) = 0 \Leftrightarrow (-3x - 1 ; 1 - 3y) \cdot (7 - 3x ; 5 - 3y) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 18x + 9y^2 - 18y - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 2y - 2/9 = 0$$

L'ensemble recherché est donc le cercle de centre $\Omega (1 ; 1)$ et de rayon $(2\sqrt{5}/3)$ cm

Exercice IV. Pour ceux qui travaillent en plus

• Valeur de a en radians. Dans ABC $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi$ soit $7a = \pi$ donc $a = \pi/7$

• Mesure de des angles BAD, ADB et ABD en fonction de a .

Les angles DAB et BAC sont supplémentaires donc $\text{BAD} = \pi - \text{BAC} = 2\pi/7 = 2a$

DBC est isocèle en C donc $\text{ADB} = \text{CDB} = (\pi - \text{DCB}) / 2 = 3\pi/7 = 3a$

$\text{ABD} = 3a - a = 2a$ ABD est donc isocèle en D.

• Calcule de AB et AC en fonction de x .

ABD est donc isocèle en D donc $\text{BD} = \text{AD} = 1$ et $\text{BC} = \text{CD} = x$

D'où $\text{AC} = \text{AB} = x - 1$

• Etablir que $\frac{\sin(3a)}{x} = \sin a$ et que $\frac{\sin(3a)}{x-1} = \sin(2a)$

Dans DBC isocèle en C, on a : $\frac{\text{BD}}{\sin C} = \frac{\text{BC}}{\sin D}$ donc $\sin(a) = \frac{\sin(3a)}{x}$

Dans ABD, on a : $\frac{\text{BA}}{\sin D} = \frac{\text{BD}}{\sin A}$ donc $\sin(2a) = \frac{\sin(3a)}{x-1}$

• Etablir que $\sin(3a) = \sin(a) \times (4\cos^2 a - 1)$

$$\sin(3a) = \sin(2a + a) = \sin(a) \times \cos(2a) + \cos(a) \times \sin(2a)$$

$$= \sin(a) [2 \cos^2(a) - 1] + 2\sin(a) \times \cos^2(a) = \sin(a) \times (4\cos^2 a - 1)$$

- Montrons que $x = 4\cos^2 a - 1$ et que $x - 1 = \frac{4\cos^2 a - 1}{2\cos a}$

D'après les questions précédentes nous avons $\sin(a) = \frac{\sin(3a)}{x}$ donc $x = \frac{\sin(3a)}{\sin(a)}$

et $\sin(3a) = \sin(a) \times (4\cos^2 a - 1)$ donc $x = 4\cos^2 a - 1$

$$1 - x = \frac{\sin(3a)}{\sin(2a)} = \frac{\sin(3a)}{\sin(a)} \times \frac{\sin(a)}{\sin(2a)} = (4\cos^2 a - 1) \times \frac{1}{2\cos(a)} \text{ donc } 1 - x = \frac{4\cos^2 a - 1}{2\cos a}$$

- Démontrons que $\cos \frac{P}{7}$ est solution de l'équation $8X^3 - 4X^2 - 4X + 1 = 0$

$$x = 4\cos^2 a - 1 \text{ et } 1 - x = \frac{4\cos^2 a - 1}{2\cos a} \quad \text{donc} \quad 1 - (4\cos^2 a - 1) = \frac{4\cos^2 a - 1}{2\cos a}$$

$$\text{soit } 8\cos^3 a + 4\cos^2 a + 4\cos a - 1 = 0$$

donc $\cos \frac{P}{7}$ est bien solution de l'équation $8X^3 - 4X^2 - 4X + 1 = 0$